

***Macrolabis brunellae* (Tavares, 1907) et *Rhopalomyia millefolii* (Loew, 1850) (Diptera Cecidomyiidae), deux espèces galligènes nouvelles pour la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane, Pyrénées-Orientales**

Joseph GARRIGUE

Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane, Laboratoire Arago,  
F - 66650 Banyuls-sur-Mer - [rnn.massane@espaces-naturels.fr]

Marcella SKUHRAVÁ

Bitovska 1227, Praha 4, CZ-140 00, Czech Republic - [skuhrava@quick.cz]

&

Patrick DAUPHIN

6 place A. Larrieu, F - 33000 Bordeaux - [patrick.dauphin@dartybox.com]

Située dans le département des Pyrénées-Orientales, la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane est connue depuis longtemps par les inventaires qui y sont menés. Sur seulement 336 hectares, 6556 espèces animales et végétales sont actuellement répertoriées, dont 29 espèces de Cecidomyiidae, ce qui n'empêche pas les nouvelles découvertes. Lors de prospections menées en octobre 2014, deux nouvelles espèces de Cecidomyiidae ont ainsi pu être ajoutées : *Macrolabis brunellae* (Tavares, 1907) (= *Macrolabis ruebsaameni* Hedicke, 1938 in Rübsaamen & Hedicke, 1938) sur *Prunella vulgaris* L. – apparemment nouvelle plante hôte observée pour cette espèce – (**Figures 1 et 2**), et *Rhopalomyia millefolii* (Loew, 1850) sur *Achillea millefolium* L. (**Figure 3**).

*M. brunellae*, d'abord considérée comme hypothétique pour la France (DAUPHIN & ANIOTSBEHERE, 1997), a ensuite été citée dans notre pays (SKUHRAVÁ *et al.*, 2005, p. 108) sous le nom de *M. ruebsaameni*, sur *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, dans deux localités du SE de la France. Elle est nouvelle pour les Pyrénées-Orientales et reste une espèce rarement observée en France, qu'il faudrait donc plutôt rechercher en fin d'été et à l'automne, à la base des rosettes de feuilles de *Prunella vulgaris*.

#### Bibliographie

DAUPHIN P. & ANIOTSBEHERE J.-C., 1997. - Les galles de France. *Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 2, 382 p., 118 pl.

SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., DAUPHIN P. & COUTIN R., 2005. - Gall Midges of France. Les Cécidomyies de France. *Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 5, 212 p., 32 pl.



**Fig. 1.** Galle de *Macrolabis brunellae*, au niveau d'une fleur de *Prunella vulgaris* (environ 5 mm de long) (photo J. Garrigue).



**Fig. 2.** Adulte de *Macrolabis brunellae* (longueur environ 3 mm) (photo J. Garrigue).



**Fig. 3.** Galle de *Rhopalomyia millefolii*, au niveau d'une feuille d'*Achillea millefolium* (longueur environ 8 mm) (photo J. Garrigue).